Rassenlijstkaartje Maïsrassen 2010

Landbouwkundige eigenschappen

rassen 3 jaar of meer in onderzoek bij PPO en / of DLV

Maïsras	Landbouwkundige eigenschappen						Zaaiadvies			Geschiktheid grondsoort
	Vroegheidsindex	Helminthosporium index[3]	Stevigheid	Stengelrot resistentie	Builenbrandresistentie	Snelheid grondbedekking	Zaaien voor 5 mei (korrels/ha x 1.000)	Zaaien na 5 mei (korrels/ha x 1.000)	Korrelmais, CCM, MKS (korrels/ha x 1.000)	goede vochtige koude grond ↔ slechte droogte gevoelige grond
Zeer Vroeg										
NK Baleric	210	3	7,5	7,5	8,5	8	105	100	n.v.t.	
Vroeg										
NK Falkone	215	3	7	8	8	8	100	95	90	
LG 30.218	220	3	8	7	8,5	8	95	90	n.v.t.	
AmBall	225	3	7,5	8,5	8	8	100	95	85	
Middenvroeg										
NK Nekta	230	3	7	8	8	8	95	90	85	
Ricardinio	230	1	8	7	8,5	8	95	90	85	
Nutreca[1]	240	3	7	8,5	8,5	8,5	95	90	n.v.t.	
Ronaldinio	240	3	7	7,5	8,5	8,5	95	90	85	
Fadeo	250	3	7,5	8,5	8	7,5	90	n.v.t.	80	
PR39F58	250	4	7,5	8	8	7,5	90	n.v.t.	n.v.t.	
Rassen in onderzoek										
SY Multitop	235	-	7	7	8,5	8	95	90	n.v.t.	
Millesim	240	-	7,5	8	7,5	8	95	90	n.v.t.	

Bron: gegevens PPO, DLV Plant, Maïskwekers en waarnemingen GroeiPartners (gemiddelde 2007 tm 2010)

[1]= Nutreca 3 jaar in onderzoek PPO, MAS17E 2 jaar in onderzoek DLV
[2]= Gegevens Maismix zijn berekend. Maismix bestaat uit de rassen Nitro, Ayrro en Messago
[4]= Gegevens onderzoek tm 2009
Helminthosporium index[3]
1= Rassen zijn vroeg gevoelig bij gewone infectiedruk, 2= Rassen zijn gevoelig bij sterke infectiedruk,
3= Rassen worden langzaam gevoelig bij sterke infectiedruk, 4= Rassen zijn bijna ongevoelig (tolerant), vaak late rassen

Ondanks alle betrachte zorgvuldigheid waarmee de cijfers van de verschillende bronnen tot stand zijn gekomen, is GroeiPartners niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, verband houdende met eventuele onjuistheden in de verschillende tabellen